Click to prove you're human

إرشادات جسر لوفينوكس وارفارينا

للتريف (حقن لوفينوكس) في بعض الأحيان ، بشكل منفرد أو بالاشتراك مع الأسبرين لمنع فقدان الحمل وغيرها من المشاكل في النساء الحوامل الذين لديهم حالات طبية معينة والذين عانوا من هذه المشاكل في حمل سابق. الإينوكساباريـن ينتمي إلى فئة من الادوية تسمى مضادات التخثر (أدوية لزيادة سيولة الدم). وهو يعمل عن طريق خفض قدرة الدم على التخثر (التجلط) . إرشادات الإستعمال حقن لوفينوكس يمكن حقنه تحت الجلد في الأنسجة الدهنية في البطن أو الفخذ أو الذراع . تجنب الحقن في المناطق التي تكون فيها الجلد رقيقا أو كدما أو حساسا أو بالقرب من ندبة أو ورم . يجب تغيير مواقع الحقن . لا تحقن في منطقة تعاني من الطفح الجلدي أو العدوى أو الالتهاب . لا تحقن في منطقة تعاني من الكدمات . لا تحقن في منطقة تعاني من الندبة . لا تحقن في منطقة تعاني من الورم . لا تحقن في منطقة تعاني من الطفح الجلدي . لا تحقن في منطقة تعاني من العدوى . لا تحقن في منطقة تعاني من